



Sentralsjukehuset i Rogaland  
4011 Stavanger

Tapping av hemokromatose pasienter ved primærhelsetjeneste :

Hemokromatose skal være histologisk bekreftet eller homozygot mutasjon i HFE genet påvist.

Tappes for 500 ml, 1 gang per uke så lenge Hb holder seg over 10g/dl og pas. tåler hyppige tappinger. Tappingsvolum og hyppighet reduseres hos de som tåler prosedyren dårlig (f.eks. 300-400 ml hver uke eller 14. dag).

Tapping fortsetter inntil s. ferritin under 50 $\mu$ g/l og metningsgrad under 40% (krever ca 1 år med tapping).

Hemoglobin og fastende s.jern, metningsgrad og ferritin måles før hver annen tapping. Lever transaminaser, måles før hver fjerde tapping.

Videre tappes profylaktisk ca 4 ganger per år for å holde s. ferritin under 50  $\mu$ g/l og metningsgrad under 40%. Tappingshyppighet styres etter jern parametre. Hemoglobin, fastende s.jern, metningsgrad, ferritin og lever transaminaser måles hver 6.-8. uke. Fastende bl. sukker måles to ganger per år.

05/98 / FVS



**Sentralsjukehuset i Rogaland**  
Avd blodbank og immunologi  
4068 STAVANGER  
Tlf: 51518816/17

## **REKVISISJON FOR TERAPEUTISK TAPPING**

**Pasientens navn:**.....

**Fødselsnummer:**.....

**Diagnose:**.....

**Begrunnelse for tapping:**

.....  
.....

**Rekvirent:**.....

**Adresse:**.....

**Telefon:**.....

**Sted og dato:**

.....

**Underskrift og stempel:**

.....

---

### **FOR BLODBANKEN**

**Evt merknader**.....

**Dato for tapping**.....

**Signatur**.....